



L'Hort



Número: 101 | Líders en el Negoci Agroalimentari

FRUITERS. TRACTAMENT D'HIVERN

El tractament d'hivern és convenient fer-lo en totes les plantacions fruiteres. Amb este tractament es pretén controlar o reduir l'atac posterior de plagues i malalties com ara el poll de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), els pugons (*Myzus persicae*...), l'abonyegat (*Taphrina deformans*), l'aranya roja (*Panonychus ulmi*), l'oïdi (*Sphaerotheca pannosa*, *Podosphaera tridactyla*) o la psil·la (*Cacopsylla pyri*).



S'ha de fer després de la poda, i banyar bé tota la fusta. Cal evitar fer el tractament en dies de vent, pluja o amb una temperatura inferior a 5 °C.

Alternatives de tractament:

1) Polisulfur de calci:

Té bon efecte contra el poll de San José i sobretot contra l'oïdi. Cal fer els tractaments en estats fenològics A/B/C. Després del tractament és important netejar bé la maquinària, ja que és corrosiu amb els components que continguem coure.

Han de transcórrer com a mínim 30 dies entre un tractament de polisulfur i un altre amb oli. S'ha d'utilitzar a soles, sense mesclar amb compostos de coure ni insecticides.


Està autoritzat en agricultura ecològica i recomanat en els programes de protecció integrada per la seua baixa toxicitat.

2) Oli mineral + insecticida + oxiclòrur de coure 50


S'aconsella quan hi ha problemes d'aranya roja, anàrsia, abonyegat, poll de San José i pugons. S'ha de fer abans de la floració, en estats fenològics C/D. Cal consultar que els productes estiguen autoritzats per al cultiu. <http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos/conaplipla.asp>

Estats fenològics de:


Albercoquer (segons A. Baggiolini)




Bresquillera (segons A. Baggiolini)



Prunera (segons A. Baggiolini)



Pomera (segons Fleckinger)



Perera (segons Fleckinger)

