

CAJAMAR
ADN AgroGRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

L'Hort

cajamar
CAJA RURAL

Número: 106

Líders en el Negoci Agroalimentari

TRACTAMENTS A L'INICI DE LA FLORACIÓ EN ELS FRUITERS DE PINYOL

En estos moments podem observar que en algunes varietats precoces els fruiters de pinyol estan iniciant la floració. Per tant, és època de fer els tractaments preventius a flor contra determinats fongs i plagues, que en la fitxa actual passem a detallar.



MONILIA

La moniliosi és una malaltia produïda pel fong *Monilia Laxa*, espècie que causa els principals problemes en el moment de la floració. Este fong es conserva a l'hivern amb forma de miceli en els xancre.

Després de colonitzar la flor, el fong entra en les branques xicotetes, produint un xancre i exsudacions gomoses. Les fulles d'estos brots afectats viren a color marró, les flors s'assequen i sobre els fruits es produïxen taques circulars terroses.




En plantacions de bresquillera, albercoquer i cirerer amb problemes d'este fong en anys anteriors i en condicions climàtiques favorables, els atacs poden ser molt virulents. Es recomana fer un tractament a primeres flors obertes i repetir a la caiguda de pètals.


En varietats o zones poc afectades per la malaltia es podrà fer una sola aplicació durant la floració, en estat fenològic F.

Estats fenològics de:


Albercoquer (segons A. Baggiolini)



Cirerer (segons A. Baggiolini)



Bresquillera i Nectarina (segons A. Baggiolini)



Si es produïxen pluges i humitats altes durant la floració, es recomana fer dos tractaments.

Les matèries actives recomanades per a l'aplicació són les següents: captà, ciproconazol, ciprodinil(*), ciprodinil+fludioxinil, clortalonil(*), difeconazol, fenbuconazol(*), fenhexamida, hidròxid cúpric, iprodiona, mancozeb, maneb, metiltiofanat(*), oxiclорur de coure, òxid cuprós, sulfat cuprocàlcic, sulfat tribàsic de coure, tebuconazol, tiram, ziram.

()no autoritzat en cirerer*