

CAJAMAR
ADN Agro

L'Hort

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMARcajamar
CAJA RURAL

Número: 116 | Líders en el Negoci Agroalimentari

AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Davant de problemes concrets de plagues i malalties en cítrics, fruiters i hortalisses, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha resolt l'autorització excepcional per a la comercialització de determinats productes fitosanitaris. Esta autorització és per a un període concret. Cal respectar les dosis d'aplicació i el nombre d'aplicacions indicades.

CÍTRICS

- Flonicamida 50% (Teppeki): aplicació contra pugons. Dosis: 1,7-5 g/hl/aplicació i 3,4-10 g/hl/campanya, amb un volum d'aigua de 1.000-3.000 l/ha. Polvorització foliar des de l'aparició dels brots en primavera-estiu. Màxim de dos aplicacions per període vegetatiu. Termini de seguretat: 60 dies. Període d'utilització autoritzat: de l'1 d'abril al 30 de juliol de 2014.

BRESQUILLERA

- Spirotetramat 100 g/l (Movento Gold): insecticida contra el pugó verd (*Myzus persicae*). Dosis: 1,5 l/ha/aplicació. Volum de caldo 500-1.500 l/ha. Màxim de dos aplicacions per període vegetatiu, espaiades almenys 14 dies. Termini de seguretat: 21 dies. Període d'utilització autoritzat: del 10 de març al 8 de juliol de 2014.

PERERA

- Spirotetramat 100 g/l (Movento Gold): insecticida contra psil·la (*Cacopsylla pyri*). Dosis: 2,25 l/ha/aplicació. Volum de caldo 500-1.500 l/ha. Màxim de dos aplicacions per període vegetatiu, espaiades almenys 14 dies. Termini de seguretat: 21 dies. Període d'utilització autoritzat: del 10 de març al 8 de juliol de 2014.
- Acibenzolar-s-metil 50% (Bion 50): tractament bactericida contra el foc bacterià (*Erwinia amylovora*). Dosis: 0,15-0,2 kg/ha/aplicació i 0,9-1,2 kg/ha/cultiu. Sis aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades com a mínim cinc dies en la fase BBCH 55-74 (55 gemmes florals, visibles, fins i tot tancades, i 74 de diàmetre dels fruits fins a 40 mm, fruits erts, estat T: el peduncle i la part baixa del fruit formen una T). Termini de seguretat: 14 dies. Període d'utilització autoritzat: de l'1 de març al 29 de juny de 2014.

POMERA

- Acibenzolar-s-metil 50% (Bion 50): tractament bactericida contra el foc bacterià (*Erwinia amylovora*). Dosis: 0,15-0,2 kg/ha/aplicació i 0,9-1,2 kg/ha/cultiu. Sis aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades com a mínim cinc dies en la fase BBCH 55-74 (55 gemmes florals, visibles, fins i tot tancades, i 74 de diàmetre dels fruits fins a 40 mm, fruits erts, estat T: el peduncle i la part baixa del fruit formen una T). Termini de seguretat: 7 dies. Període d'utilització autoritzat: de l'1 de març al 29 de juny de 2014.

NISPRO JAPONÉS

- Acibenzolar-s-metil 50% (Bion 50): tractament bactericida contra el foc bacterià (*Erwinia amylovora*). Dosis: 0,15-0,2 kg/ha/aplicació i 0,9-1,2 kg/ha/cultiu. Sis aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades com a mínim cinc dies. Les aplicacions s'han d'iniciar després de la recol·lecció de la fruita. Termini de seguretat: no és procedent. Període d'utilització autoritzat: des de després de la recol·lecció fins al 29 de juny de 2014.

CAQUI

- Difenoconazole 25% (Score, Ceremonia, Core...): tractament contra la necrosi foliar del caqui (*Mycosphaella nawae*). Dosis: 20-30 cc/hl, amb un màxim de 450 cc/ha. Dos aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades almenys 15 dies. Termini de seguretat: 100 dies. El període d'autorització acaba el 30 de juny de 2014.
- Mancozeb 80% (diversos): tractament contra la necrosi foliar del caqui (*Mycosphaella nawae*). Dosis: 300 g/hl, amb un màxim de 6 kg/ha. Dos aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades almenys 15 dies. Termini de seguretat: 100 dies. El període d'autorització acaba el 30 de juny de 2014.
- Piraclostrobina 25% (Cabrio): tractament contra la necrosi foliar del caqui (*Mycosphaella nawae*). Dosis: 0,3-0,4 l/ha. Dos aplicacions màximes per cycle de cultiu, espaiades almenys 15 dies. Termini de seguretat: 100 dies. El període d'autorització acaba el 30 de juny de 2014.

VINYA

- 1,3 dicloropropé (diversos): tractament nematicida/fungicida per a la desinfecció de sòls nus, abans del trasplantament. Aplicació mitjançant injecció al sòl. Màxim d'una aplicació per període vegetatiu. Dosis en funció del producte utilitzat.
- Levandulyl Senecioate (Checkmate VMB-XL): tractament insecticida contra la cotxinilla farinosa de la vinya (*Planococcus ficus*). Dosis: 0,093 kg de substància activa/ha, repartits en 620 difusors/ha (150 mg/difusor). Aplicació mitjançant difusors de vapors de feromona de l'insecte. Màxim d'una aplicació per cycle de cultiu/temporada, abans de l'inici del vol de la primera generació. Termini de seguretat: no és procedent. Període d'utilització autoritzat: des de l'1 de març fins al 29 de juny de 2014.

MADUIXERAR

- Pimetrozina 50% (Plenum): insecticida d'aplicació foliar contra pugons. Dosis: 400 g de producte/ha/aplicació. Màxim de tres aplicacions per període vegetatiu, espaiades set dies. Termini de seguretat: tres dies. Període d'utilització autoritzat: del 21 de març al 19 de juliol de 2014.

CEBA

- Dimetoat 40% (Rogor, Perfekthion, Dafece progress...): insecticida contra la mosca de la ceba (*Delia antiqua*). Dosis: 0,5-0,6 l/ha/aplicació. Màxim de dos aplicacions per període vegetatiu, espaiades entre 10 i 14 dies. Termini de seguretat: 14 dies. Període d'utilització autoritzat: de l'1 d'abril al 30 de juliol de 2014.

ARRÒS

- Propanil 48% (diversos): herbicida contra *Echinochloa spp*, *Scirpus spp*, *Cyperus spp*, *Alisma spp*, *Leptochloa spp*. Dosis: 1,1 l/ha/aplicació. Màxim de dos aplicacions per període vegetatiu, espaiades almenys 15 dies. Termini de seguretat: 90 dies. Període d'utilització autoritzat: del 15 de maig al 31 d'agost de 2014.

TABAC

- 1,3 Dicloropropé (diversos): tractament nematicida/fungicida per a la desinfecció de sòls nus, abans del trasplantament. Aplicació mitjançant injecció al sòl. Màxim d'una aplicació per període vegetatiu. Dosis en funció del producte utilitzat.