



CAJAMAR
ADN Agro



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

L'Hort




cajamar
CAJA RURAL

Número: 123 | Líders en el Negoci Agroalimentari

TRACTAMENT DE LA PALOMETA DE L'OLIVERA

Estem en la temporada de fer el tractament per al control de la palometa de l'olivera (*Prays oleae*) i la protecció dels nous brots i fruits acabats de quallar enfront del repiló (*Spilocaea oleagina*).

PRAYS (*PRAYS OLEAE*)



Com que és la més perjudicial, es recomana el control de la tercera generació de palometes de l'olivera, també denominada *generació carpòfaga*. El període crític comprén des que el fruit té un 10% de la seua grandària final fins que s'endurix el pinyol. Durant este període cal observar les olives quallades per a vore si hi ha postes. Es recomana tractar-les si s'observa un 20% d'olives amb postes i n'han eclosionat el 20%.

Productes autoritzats: *dimetoat* (no per a la varietat Blanqueta), *fosmet* i *lambda cihalotrín*. El pH del caldo insecticida ha de ser de 5 a 5,5.

REPILO (SPIOLOCAEA OLEAGINA)

Aprofitant el tractament per a la palometa de l'olivera, és molt recomanable afegir un fungicida per a protegir els nous brots i fruits acabats de quallar d'una possible infecció de repiló.



Productes autoritzats: *compostos de coure, mancozeb, difenoconazole, trifloxistrobín i dodina.*

L'olivera respon molt bé a les aportacions de nutrients per via foliar, especialment a la primavera, i per això es pot afegir al tractament anterior nitrat potàssic al 2%.