



# L'Hort



Número: 141 | Líders en el Negoci Agroalimentari

## ERUGUES I BARRINADORS DE LA CARXOFA

Hi ha diferents erugues que afecten el cultiu de la carxofa. La més predominant en les nostres condicions de cultiu sol ser la rosquilla negra (*Spodoptera littoralis*), acompanyada en alguns anys de rosquilla verda (*Spodoptera exigua*). A la primavera presenta dos generacions. La tercera generació es presenta als mesos de setembre i octubre, i és la que sol produir danys importants en el cultiu. Hi ha zones on també hi ha atacs d'erugues del gènere *Heliothis* sp.



El barrinador (*Gortyna xanthenes*) és una plaga clau en la carxofa. Als mesos de setembre i octubre es produïx el vol de les palometes. El tractament ha de fer-se durant el període d'eclosió dels ous, que sol ser de mitjan novembre a març. Les larves roseguen els òrgans de les plantes.

El barrinador de la dacsa (*Ostrinia nubilalis*). En plantacions pròximes a camps de dacsa, poden aparèixer atacs d'esta plaga als mesos de setembre i octubre. No solen causar greus danys en la planta. Perforen canonades de goteig per a crisalidar-se dins.

L'arna (*Depressaria erinacella*). La posta la sol fer a finals de setembre. Als mesos d'octubre i novembre apareixen larves. Comencen per rosegar el nervi de les fulles. La simptomatologia del dany és semblant a la del barrinador, però este ve més tard. Perforen les bràctees dels capítols. Amb el fred queda letàrgica per a tornar a actuar a la primavera; este estat s'allarga fins al mes d'abril, en què abandona la planta per a crisalidar-se en terra. És important actuar abans que penetren en els capítols.

Per al control cal utilitzar productes autoritzats en el cultiu. Consulte l'enllaç següent:

<http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos/conaplipla.asp>