



SEMBRA DE CEBA BAVOSA

Al principi del mes d'octubre estem en la temporada de fer les sèmres de varietats de ceba del cicle bavosa, la plantació de les quals s'ha de fer al mes de desembre per a recol·leccions del mes de maig.

La sembra de la ceba es pot fer a través de la sembra directa o sembra en planter per a trasplantar-la posteriorment.

Sembra directa:

Quan s'opta per esta modalitat de cultiu, és molt important preparar bé el terreny perquè quede el més fi possible, amb bon drenatge, poc compacte, ja que pot dificultar la germinació, i lliure de males herbes. La llavor ha de ser preferiblement pindolada i presentar una bona germinació. Es poden utilitzar sembradores per fileres o, per a una millor uniformitat de sembra, sembradores de precisió.

Sembra en planter:

En el litoral mediterrani, tradicionalment la sembra s'ha fet en terra sobre bancades. Una vegada desenvolupades les plantes, s'arranquen i es fan manolls amb arrel nua per a trasplantar-les manualment al camp definitiu. En esta modalitat de sembra cal tindre en compte les mateixes consideracions que les comentades anteriorment per a la sembra directa quant a la preparació del terreny.

Una altra modalitat de planter és la sembra en safates de poliestiré amb mesclres de substrats. Per a això se solen utilitzar safates que oscil·len entre els 322 i els 589 alvèols, per a posteriorment fer la plantació manualment.



Hi ha també la possibilitat de mecanitzar la plantació amb trasplantadores de tipus "japoneses", com la que podem observar en la fotografia següent. Amb esta opció s'aconsegueix un estalvi important en els costos de mà d'obra respecte a la plantació manual. Esta maquinària requereix un tipus de safata especial flexible de 448 alvéols, que serà necessari tindre en compte a l'hora de fer el planter, si s'opta per este tipus de trasplantament.



L'elecció de la varietat és un aspecte important a considerar, ja que hi ha diferències importants entre elles pel que fa a diàmetre de coll, inici de bulbació, nivell de vegetació, color de la fulla, forma del bulb, quantitat de bulbs dobles, resistència a espigat, producció final, etc.

Una altra consideració important que cal tindre en compte és la sensibilitat de la cultivar al míldiu, malaltia molt important en determinades zones de cultiu, causada pel fong *Peronospora destructor* (Berk), i que, com hem pogut constatar en diferents assajos, hi ha diferències clares de sensibilitat varietal.

Entre les varietats assajades en el Centre d'Experiències de Cajamar a Paiporta van destacar: Bavosa (Ramiro Arnedo), Bavosa (Intersemillas), Prebosa (Fitó), Amonquelina (Batlle), Nieto (Bejo) i Gabriella (Enza Zaden).