



CAJAMAR
ADN Agro



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

L'Hort



Número: 89

Líders en el Negoci Agroalimentari

RECOL·LECCIÓ DE BRÒQUIL

A Espanya el cultiu del bròquil a major escala data de principis de la dècada de 1970, desenvolupat principalment per empreses exportadores amb vista al comerç exterior en fresc, i posteriorment destinada al processament industrial, sobretot el congelat.



Del bròquil s'aprofiten les seues preinflorescències o inflorescències, que tenen un sabor característic, per la presència, com en el cas de les cols, d'algun glucosinolat, als quals s'atribuïxen propietats anticancerígenes.



Els bròquils difereixen fonamentalment de les florícols en el fet que, a més de rematar les seues tiges principals en una massa globulosa de botons florals, lateralment i en les axil·les de les fulles, poden desenvolupar brots d'inflorescències, menys grans que el de la inflorescència principal, que apareixen de manera gradual i escalonada, generalment després de tallar el cabdell terminal.

Alguns cultivars de bròquils no produeixen una inflorescència principal, sinó només multitud de brots axil·lars, i per això s'anomenen *cultivars de bròquil de rebrots*.

La intensitat de la rebrotada axil·lar, dels diferents cultivars de bròquil, és molt variable, en funció del seu genotip.



La recol·lecció per a consum en fresc s'ha de realitzar fent diverses passades per parcel·la per a collir les peces en el punt idoni. Normalment és fan tres passades (en aproximadament de 10 a 15 dies) per a la recol·lecció d'inflorescències principals, i, si es decidix la collita de rebrots, el període podria allargar-se de 15 a 30 dies.

En el bròquil, les inflorescències s'han de collir en el moment òptim, i evitar recol·lectar-les massa prompte, ja que això implicaria un pes inferior de la inflorescència, i per tant menys rendiment, així com la recol·lecció de peces massa passades, que puguen tindre els botons florals excessivament oberts i menys aguant després de la recol·lecció.



La collita es fa normalment de forma manual, si bé en extensions grans la recol·lecció tendix a racionalitzar-se per mitjà de l'ús de tractors proveïts d'uns bastidors transversals en la part posterior del remolc.



En el bròquil cal evitar, sempre que siga possible, la recol·lecció en moments del dia en què la temperatura siga elevada i cal prrefredar ràpidament.