

CAJAMAR  
ADN AgroGRUPO  
COOPERATIVO  
CAJAMAR

# L'Hort

cajamar  
CAJA RURAL

Número: 91

Liders en el Negoci Agroalimentari

## FRUITERS. TRACTAMENT DE LA CAIGUDA DE LA FULLA

Durant el període de caiguda de la fulla, quan es desprenen, es produïxen xicotetes ferides en el punt d'abscisió que poden donar lloc a l'entrada de diversos fongs i bacteris. Són dates en què es produïxen les formes hivernals de fongs que poden afectar el cultiu la primavera següent. Este tractament és interessant fer-lo en els arbres fruiters de pinyol, llavor i ametler.



La recomanació és fer un tractament fungicida utilitzant compostos cúprics a dosis altes. Sempre cal comprovar que el producte estiga autoritzat per al cultiu. En els fruiters de llavor, este tractament es recomana quan hagen caigut el 50% de les fulles, i en els fruiters de pinyol, al 75% de fulles caigudes.

Si durant esta campanya hem tingut problemes de monilia o *Fusicoccum*, afegirem al tractament tiram o metil-tiofanat (no per a l'ametler).



En les plantacions de perera i pomera on hi haja hagut problemes de motejat, és recomanable afegir al tractament urea (10 kg d'urea del 46% de riquesa per cada 100 litres d'aigua) i tractar també les fulles caigudes a terra. És important banyar bé totes les fulles. L'efecte que s'aconsegueix amb l'addició de la urea és accelerar la descomposició de les fulles, la qual cosa impedirà la formació de periteques que donaran lloc a les espores responsables de les infeccions primàries de motejat a la primavera següent. Després de fer el tractament amb urea, és important rentar bé amb aigua el tractor i l'equip de tractament per a evitar el seu efecte corrosiu. En varietats de poma roja no s'ha d'aplicar urea fins que hagen caigut el 80% de les fulles.