



CAJAMAR
ADN Agro



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

L'Hort



Número: 99

Liders en el Negoci Agroalimentari

CONTROL D'ADVENTÍCIES EN LA CREÏLLA

En general, el control de males herbes es pot fer per mètodes manuals, mecànics, amb l'ús d'herbicides o una combinació d'estos tres.

Control per mètodes manuals

En general convé actuar quan l'herba acaba d'emergir.

S'aconsella en parcel·les de xicotetes dimensions o en aquelles en què estan subjectes a normes de producció ecològica, on no està permès l'ús d'herbicides. Este mètode es pot utilitzar sol o associat a altres mètodes mecànics.

Control per mètodes mecànics

Es du a terme amb maquinària i arres més o menys sofisticats. Es pot fer coincidir amb el calçat, per a posteriorment fer una escarda manual o ús d'herbicides específics en el llom del solc. Un bon control en les primeres fases de desenvolupament del cultiu permet millorar-ne l'eficiència.



Control per mitjà de l'ús d'herbicides

-Tractament de preemergència

S'ha de fer el més prompte possible després de la plantació. Este tractament es pot aplicar bé en tota la parcel·la o únicament sobre el cavalló si es fa posteriorment el calçat, i el terreny ha de presentar una bona saó perquè el tractament siga més efectiu. Es podria presentar fitotoxicitat en dos casos particulars: si l'aplicació és massa tardana o si es produïxen precipitacions després del tractament.



-Tractament de postemergència

Quan es presenten males herbes no controlades pels herbicides de preemergència, o després de la labor de calçat, es pot recórrer a herbicides de contacte. Hi ha herbicides selectius per a la creïlla que es poden aplicar amb la planta emergida, seguint sempre les recomanacions del fabricant.



A continuació presentem un quadre amb els principals herbicides utilitzats en el cultiu de la creïlla:

Època d'aplicació	Males herbes	Matèria activa	Marca comercial	Dosi	Observacions
Pre - emergència de males herbes	Males herbes anuals	Pendimetalina 33%	Stomp LE	4-6 l/ha	Aplicar sobre el cavalló de sembra, en preemergència, o recent aparició de les herbes. Pre i post- emergència primerenca.
		Linuron 50%	Linagan 50 SC	1,6 – 1,8 l/ha	
		Metribuzina 70%	Lexone 70	0,75 kg/ha	
Post - emergència de males herbes	Gramínies anuals i vivaces	Fluazifop -p-butil 12,5%	Fusilade Max	1,25 - 2 l/ha	Postemergència precoç de males herbes
	Dicotiledònies	Diquat 20%	Mission	2 l/ha amb un volum de caldo de 300-500 l/ha	

* Nota: L'aplicació d'estos herbicides s'ha de fer quan el cultiu encara no ha emergit.